

正 本

檔 號：  
保存年限：

111>94

## 衛生福利部疾病管制署 函

機關地址：10050台北市中正區林森南路6號  
承辦人：蘇星瑈  
電話：23959825#3001  
電子信箱：cindy0110@cdc.gov.tw



10449

台北市民權西路70號5樓

受文者：臺灣婦產科醫學會

發文日期：中華民國111年7月18日

發文字號：疾管慢字第1110300264B號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：衛教宣導單張樣稿及配賦表1份

理	事	長	秘	書	長	秘	書	掃	描
事長黃閔照			書長黃建霖		印鑑				

主旨：為宣導民眾避免因施用成癮性藥物而感染愛滋病毒，鼓勵運用藥癮戒治與愛滋防治資源及服務，本署將於近日內寄達「藥癮減害與藥愛防治」衛教宣導品一批，敬請貴學會惠予協助廣為宣導，請查照。

說明：

一、成癮性藥物依成分可區分為鴉片類與非鴉片類藥物，無論以吸食或注射方式施用，均可能因共用針具或以藥助性(chemsex)等行為，大幅提升感染愛滋病毒等傳染病之風險。

二、為強化民眾正確防治知能，適時提供其藥癮戒治與愛滋防治資源與服務管道資訊，以預防愛滋病毒感染，本署製作旨揭衛教宣導品(分為立體摺頁卡及平面摺頁單張)，請貴學會惠予協助轉知所屬醫師會員等，於辦理相關衛教宣導服務時參考運用。

三、有關旨揭衛教宣導品電子檔，可逕至本署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw/>)/傳染病與防疫專題/傳染病介

取 1. 宣導品取用性化面版 10/23

紹/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒感染/宣導素材  
項下查詢及下載運用。

正本：臺灣婦產科醫學會、臺灣家庭醫學醫學會、臺灣泌尿科醫學會、臺灣兒科醫學會、臺灣內科醫學會、中華民國大腸直腸外科醫學會、臺灣青少年醫學暨保健學會、臺灣皮膚科醫學會、臺灣感染症醫學會、台灣成癮學會、台灣急診醫學會

裝 副本：

署長周志浩



線

# 藥愛防治



## 非鴉片類

藥物種類：甲基安非他命(煙、安、冰等)、K他命、搖頭丸、大麻、G水、喵喵等非鴉片類藥物。


施用方式：常見以吸食或注射(slam)方式施用。

危險性：發生「藥愛」(Chemsex)行為，又稱以藥助性，指性行為時合併使用成癮藥物，以增強感官或感受，而出現自制力降低、影響思考與判斷，繼而發生未有保護措施的性行為，大幅提升感染愛滋病毒、梅毒、淋病等性傳染病之風險。

### 預防方式：

- 避免使用藥物助性。
- 性行為時全程正確使用保險套與水性潤滑液。
- 有風險行為，每3-6個月進行愛滋篩檢。
- 使用暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)，預防感染愛滋。
- 有用藥問題，積極尋求指定藥癮戒治機構或相關單位協助。

## 風險行為vs預防方法



## 愛滋防治資源與服務管道

### 愛滋篩檢服務管道



疾管署與醫療院所合作，提供免費、快速、隱私且保密的匿名篩檢服務，只要約20分鐘即可知道檢驗結果！



您也可以購買愛滋自我篩檢試劑，自行檢測唷！



### 篩檢結果代表什麼意義呢？



愛滋匿名篩檢及自我篩檢都屬於初步檢驗，檢驗結果若呈「陽性」，不代表確診感染，請務必前往「愛滋指定醫療院所」接受進一步確認檢驗。



愛滋初步檢驗結果若呈「陰性」，代表沒有感染，但仍可能處於空窗期，還是要避免風險行為、定期篩檢唷！



### 什麼是暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)?

PrEP是國際研究證實可有效預防愛滋病毒的事前預防性藥物，透過持續穩定服用藥物，預防感染愛滋病毒的保護力可達9成。



注意!!使用PrEP須經醫師評估，且沒有感染愛滋病毒唷！



## 風險行為vs預防方法



## 藥癮戒治資源與服務管道

### 有用藥問題或需要戒癮治療?

各縣市政府設有毒品危害防制中心(諮詢專線：0800-770-885)，提供心理支持、法律諮詢、戒癮、愛滋篩檢、減害計畫等服務。



您也可以前往衛生福利部指定之藥癮戒治機構，尋求醫療院所身心科或精神科醫師協助。



### 哪裡可以取得清潔針具呢?

各縣市衛生局設有清潔針具執行點及衛教諮詢服務站唷!



清潔針具使用後，請記得將針具繳回，不可以棄置在一般垃圾桶唷!



### 認識更多藥癮與愛滋相關資訊?

心口司



藥癮衛教宣導資源

疾管署




藥癮愛滋減害Q&A



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

# 藥癮減害



### 鴉片類

**藥物種類：**海洛因(4號、白粉)等鴉片類藥物。

**施用方式：**常見以注射方式施用。

**危險性：**共用針具(包含針頭、針筒、稀釋液)而大幅提升感染愛滋、B/C型肝炎等血液傳染病之風險。

### 預防方式：

- 不共用針具、稀釋液、容器。
- 利用各縣市衛生局有提供之清潔針具、稀釋液等衛教諮詢服務。
- 有風險行為，每3-6個月進行愛滋篩檢。
- 使用暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)，預防感染愛滋。
- 有用藥問題，積極尋求指定藥癮戒治機構或相關單位協助。